

المملكة الأردنية الهاشمية



المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي



# قطاف ثمار الزيتون

إعداد  
م. خليل جرن

٢٠٠٩

(١)

اللون وعدم فقدانه عندما توضع الثمار في محلول ملحي.

### ٣- القطف لإنتاج الزيت

ينصح بقطف ثمار الزيتون بعد تلون ٧٥% من ثمار الشجرة الواحدة باللون الأسود.

### الطرق السليمة لقطف الزيتون :

١- جمع الثمار المتساقطة قبل القطف والثمار المصابة وعزلها عن الثمار السليمة لأنها تزيد



(٢)

### قطف ثمار الزيتون

أخي المزارع - اتباعك للخطوات الصحيحة في جني ثمار الزيتون، يساعذك في الحصول على إنتاج وفير كماً ونوعاً سواء كان القطف لغرض التخليل أو الزيت.

❖ يفضل عدم الاعتماد على التقويم الزمني لمواعيد القطف واللجوء إلى علامات النضج حسب الحالات التالية:

### ١- زيتون التخليل الأخضر (الرصيع)

يتم قطف ثمار الزيتون عند اكتمال حجم الثمار وتغير لونها من الأخضر إلى الأخضر المصفر.



### ٢- زيتون التخليل الأسود

ينصح بقطف الثمار بعد أسبوعين من اكتمال تلون الثمار باللون الأسود للتأكد من استقرار

(٣)



من نسبة حموضة الزيت.

٢- استخدام المفارش المناسبة والتنظيف أسفل

الشجرة عند قطافها، يسهل عملية جمع الثمار

ويجنبها ملامسة الأرض واصابتها بجروح.

٣- اتبع طريقة القطاف اليدوي باستخدام

الأمشاط.



استعمل السلالم المزدوجة.

## نقل وتخزين الزيتون :

- ١ - استخدم عبوات بلاستيكية ذات تهوية جيدة وتجنب استخدام الأكياس وبشكل خاص أكياس البلاستيك.
- ٢ - الاتفاق المسبق مع المعصرة على موعد عصر الزيتون بحيث يتم خلال ٢٤ ساعة بعد إتمام القطف.
- ٣ - إذا تأخر موعد العصر، أنشر الثمار في أماكن مظلمة جيدة التهوية بدرجة حرارة لا تزيد عن (١٥) درجة مئوية وبسماكة لا تزيد عن (٢٠ سم) مع مراعاة قلب الثمار من وقت لآخر.
- ٤ - تخزن صفائح الزيت في المخازن على ألواح خشبية بعيداً عن رطوبة الأرض وعن المواد ذات الروائح النفاذه.
- ٥ - عدم تخزين الزيت في أواني شفافة لأن ذلك يؤدي إلى افساد تركيبه وتغير لونه.

## مع تمنياتنا لك بموسم جيد


نشرة رقم ( ٢٣ )

المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي  
تنفيذ

مديرية التوعية والاعلام الزراعي  
( قسم الوسائل الارشادية )

هاتف : ٤٧٢٥٠٧١ فاكس : ٤٧٢٦٠٩٩

( ٢٠٠٩ )



٤ - استعمل السلالم المزدوجة.

٥ - تجنب عملية ضرب الأشجار بالعصي

لاسقاط الثمار لأنها :

أ - تقلل من إنتاج الموسم التالي بسبب تكسير

النموات التي تحمل الثمار في الموسم القادم.

ب - تؤدي لتجريح الثمار وبالتالي لرداءة

نوعيتها وزيادة نسبة الحموضة في الزيت.